

Segurança do tratamento com Esbriet em doentes com FPI diagnosticados com Covid-19

A segurança dos doentes é uma prioridade para a Roche que está a monitorizar de perto a evolução do contexto COVID-19.

- De acordo com o Resumo das Características do Medicamento, uma infeção ativa não é uma contraindicação ou precaução especial de utilização de Esbriet (secção 4.3 e 4.4).
- Não existem recomendações acerca da suspensão do tratamento em doentes com infeção por SARS-CoV-2.
- A decisão deverá ser tomada com base numa avaliação benefício/risco específica para cada doente. Qualquer decisão de tratamento é da responsabilidade do médico prescriptor.
- Por favor, considere que algumas patologias poderão levar a um maior risco de imunodeficiência independente do tratamento. Algumas organizações profissionais publicaram informações gerais sobre a Covid-19 para doentes e profissionais de saúde. Poderá consultar através do link: [British Thoracic Society Advice for Managing Interstitial Lung Disease Patients during COVID-19 pandemic](#).

Para mais informações, entre em contacto com a equipa MedInfo através do 21 425 70 07 ou pelo email portugal.medinfo@roche.com.

A Roche Farmacêutica não emite pareceres ou recomendações clínicas, permanecendo a responsabilidade de qualquer intervenção com o profissional de saúde.

Por favor consulte [aqui](#) o Resumo das Características do Medicamento para informação aprovada do produto.

Referências:

Resumo das Características do Medicamento - Esbriet 267 mg cápsulas