


Cancro da Bexiga: os factos

*Não se registam, nos últimos 30 anos¹
avanços significativos no tratamento do cancro da bexiga metastizado.*


Evolução dos tratamentos no tempo



Os números²




Prognóstico



O cancro da bexiga é um dos 10 tipos de cancro mais frequentes no mundo

Sintomas Comuns⁴



Referências

1. Powles T et al. MPDL3280A (anti-PD-L1) treatment leads to clinical activity in metastatic bladder cancer. *Nature* 2014; 515(7528): 558–62.
2. Ferlay J et al. GLOBOCAN 2012 v1.0. Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: <http://globocan.iarc.fr>. Accessed August 2015.
3. National Cancer Institute: SEER Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. Available at: <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html>. Accessed September 2015.
4. National Cancer Institute: PDQ® Bladder Cancer Treatment. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Date last modified July 2015. Available at: <http://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq>. Accessed August 2015.